ROSA RUBRIFOLIA.

R. germinibus overis pedunculisque glabris glaucescentibus, petiolis aculeatis, caule aculeis sparsis uncinatis, foliolis olilongis argute serratis glabris (glauco-rabris), floribus subcorymbosis. William spec. 2, pag. 1075. Pers. syn. 32. Vill. Fl. du Dauph. 3, pag. 549.

R. (Multiflora.) REGNIER, Act. Soc. Laus. 1, pag. 70.
R. (Canina.) fol. glaucis rubedine tinctis, floreque rubro.

R. (Canina.) fol. glaucis rubedine uneus, pioreque rubro. (Var. b.) Super. Flor. Helvet. 1, pag. 302, v. 13.

Rosier à feuilles rougeâtres, D.C. Nouv. Fl. franç. 3711.

R. (Glauca.) Deleuze, dans l'Hist. des arbres et arbrisseaux de Desfontaines, 2, pag. 165.

ROSIER A FEUILLES ROUGEATRES.

DESCRIPTION.

Cet arbrisseau, rougeatre et recouvert d'une poussière glauque dans toutes ses parties, forme un buisson dont les tiges s'élèvent jusqu'à huit, et même dix pieds, plus ou moins, selon le site dans lequer il végète. Ses tiges sont armées d'aiguillons fermes et recourbés. Les feuilles, munies à leur base de deux stipules entières, se composent de cinq, sept, et quelquefois de neuf folioles ovales-oblongues, molles au toucher, dentées en scie, glabres, glauques, d'une teinte vineuse, particulièrement en-dessous : leur pétiole est muni d'aiguillons jaunatres. Les fleurs rouges, dans leur jeunesse, et d'un blanc-verdatre dans leur entier développement, sont disposées en bouquet au sommet des rameaux. Chaque pé-



mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300